

BORELIÓZA

Borelióza je nejčastější onemocnění lidí a psů přenášené klíšťaty. Původcem je bakterie *Borrelia burgdorferi*. Hlavním přenašečem je klíště obecné, v menší míře se může na přenosu podílet i další krevsající hmyz (blechy, komáři, vši...).

U psa, na rozdíl od člověka, nezjistíme lokální kožní změny, zarudnutí v místě přisátí klíštěte. Inkubační doba onemocnění je až několik měsíců, tzn. že příznaky se objevují až po dlouhé době od nakažení. Často se klinické příznaky objevují až po opakovaných infekcích. Nejčastějším příznakem jsou pohybové problémy, kulhání na více končetin, otoky kloubů, bolestivost na pohmat. Dále můžeme pozorovat i bolestivost svalů, nechutenství, horečku, letargii. Těžké formy postihují i srdce, nervový systém, ledviny.

Jelikož vakcinace není běžnou součástí „kombinace“, doporučujeme u psů, přicházejících pravidelně do styku s klíšťaty, každoroční vakcinaci. nejlépe v zimě, před vypuknutím sezóny výskytu klíšťat, prohlídky po návratu z procházek a pravidelné ošetřování psů ektoparazitiky (obojky, spoty, spreje)

Nedoporučujeme odstraňovat přisátá klíšťata ze zvířat prsty, ale pomocí speciálních pinzet, aby nedošlo k nakažení majitele.