

LEPTOSPIRÓZA

Leptospiroza je bakteriální onemocnění domácích, hospodářských, ale i volně žijících zvířat. Leptospiroza je zoonóza, to znamená, že je přenosná i na člověka.

Hlavními rezervoáry v přírodě jsou hlodavci, kteří leptospiry vylučují močí a dále vlhká místa, stojaté vody.

Pes se nakazí přímo od zvířat nebo pitím kontaminované vody. Leptospiry také mohou pronikat porušenou kůží, např. drobnými rankami, z infikované vody.

Příznaky jsou závislé na věku a imunitním stavu psa, ale i na sérovaru leptospir a na rozsahu postižení orgánů. K hlavním příznakům patří zvracení, průjemy, žloutenka, výrazně tmavá moč, krvácení na sliznicích. Akutní stadium může přejít v chronické postižení jater nebo ledvin a může být příčinou pozdějšího selhání orgánů. Vylučování leptospir u nakažených zvířat může přetrvávat až několik let.

Vzhledem k nemožnosti vyloučit kontakt psů s močí hlodavců, je důležitá řádná každoroční vakcinace. Vakcinace proti leptospiroze je běžnou součástí kombinovaných vakcín.

Statistiky uvádějí každoroční úmrtí 4-6 lidí na následky leptospirozy.