

PSINKA

Psinka je velmi nebezpečné virové onemocnění psů s vysokou úmrtností (až 80%). Vnímavější jsou štěňata, ale mohou onemocnět i starší psi.

K nakažení dochází orálně i aerogenně sekrety a exkremty nemocných psů nebo klinicky zdravých přenašečů viru. Inkubační doba se pohybuje mezi 3-7dny. Klinické příznaky jsou velmi variabilní a závisí na kmeni viru, věku psa a individuální odolnosti zvířete.

Virus primárně napadá dýchací aparát, šíří se do lymfatických tkání, trávicího a močopohlavního aparátu a dále do nervové tkáně. Podle toho se mohou lišit i klinické příznaky onemocnění. Klinické příznaky závisí i na výskytu sekundárních infekcí způsobených jinými viry, či bakteriemi:

- střevní forma: zvracení, průjemy, dehydratace, rychlé hubnutí
- respirační forma: hnisavé výtoky z nosu, zasychající a tvořící krusty
- kolem nosních otvorů, bronchopneumonie, kašel
- oční změny: záněty duhovky, degenerace sítnice, záněty rohovky, event. tvorba vředů
- kožní forma: zarudnutí až puchýře, hl. na břicho a vnitřní straně steh. Zvláštní formou je hyperkeratózní forma, kdy dochází ke ztvrdnutí polštářků, event. nosní houby.
- nervová forma: různé projevy postižení nervové tkáně od tiků, křečí čelistí,
- epileptických záchvatů až po paralýzy

Léčba je obtížná a pouze podpůrná. V časných případech lze použít hyperimunní séra. Přesto je mortalita velmi vysoká. V současné době se díky kvalitním vakcínám a dodržování doporučeného vakcinačního schématu, alespoň v mém okolí, takřka nevyskytuje.

Vakcinace probíhá v rámci běžné prevence a je součástí kombinovaných vakcín. První vakcinace probíhají již od 6. týdne věku.